

<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuzione Controllata	Copia n° [FORNITA A TUTTI GLI OPERATORI DEL COMPARTO]
<input type="checkbox"/>	Distribuzione Controllata Non	

Matrice delle revisioni e descrizione modifiche

00	06.03.2025	Prima Emissione	<i>Francesca Maria Morsicotti</i>	<i>Antonio Pizzotto</i>	<i>Francesca Maria Morsicotti</i>
Rev.	Data	Descrizione	Redatto da RQ	Verificato da DS	Approvato da DIR

Documento valido fino al 05.03.2025

SOMMARIO:

1. Scopo ed Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Descrizione delle attività
4. Responsabilità
5. Allegati
6. Riferimenti normativi
7. Monitoraggio

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo protocollo disciplina le procedure di lifting del volto e del collo, definendo gli standard di sicurezza e qualità in accordo con le linee guida AICPE e i principi dell'EBM.

Si applica agli interventi che vengono eseguiti presso il Polo Chirurgico MEDISAN.

2. DEFINIZIONI

- **Lifting del Volto e del Collo:** Intervento chirurgico volto a ridurre i segni dell'invecchiamento attraverso il riposizionamento dei tessuti molli e l'asportazione della cute in eccesso.
- **EBM:** Medicina basata sulle prove di efficacia.
- **AICPE:** Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

- **Valutazione preoperatoria:** Prima dell'intervento, il chirurgo esegue una valutazione approfondita del viso e del collo del paziente. Questa fase prevede l'analisi delle condizioni della pelle, dei muscoli e dei tessuti sottostanti per determinare la tecnica più adatta a ottenere risultati naturali. Durante questa visita, si discute anche del tipo di anestesia da utilizzare e del risultato finale che il paziente può aspettarsi. La fase preoperatoria comprende esami ematochimici quali emocromo con formula, fattori della coagulazione, V.E.S. e PCR, valutazione fotografica, elettrocardiogramma ed una visita dall'anestesista. Il paziente deve seguire prima di sottoporsi all'intervento, delle accortezze, quali: interrompere l'assunzione di alcuni tipi di farmaci, ad esempio, anticoagulanti (almeno sei giorni prima dell'intervento) e alcuni tipi di antinfiammatori; evitare di fumare (anche sigarette elettroniche e sigarette senza combustione).

Anestesia: l'intervento di lifting del viso può essere eseguito in anestesia generale o con sedazione cosciente associata ad anestesia locale, a seconda della complessità dell'intervento e delle preferenze del paziente. La scelta dell'anestesia viene discussa durante la fase pre-operatoria, garantendo che il paziente sia completamente a suo agio e non avverta dolore durante l'intervento.

- **Preparazione chirurgica:** La zona di interesse chirurgico viene disinfettata con tintura di iodio con tecnica di pennellatura con garze intinte di tintura di iodio, successivamente viene reperito un accesso venoso periferico (18g) con inserto a due/tre vie, l'anestesia potrà eseguire anestesia locale con sedazione.
 - **Esecuzione** Le incisioni per il lifting del viso vengono generalmente fatte lungo la linea dei capelli, vicino alle orecchie e talvolta estese fino al cuoio capelluto. In questo modo, le cicatrici risultano ben nascoste e difficilmente visibili una volta guarite. Le incisioni permettono al chirurgo di accedere ai tessuti più profondi del viso e riposizionare i muscoli e la pelle in modo naturale. Riposizionamento e risospensione dei tessuti.
Una volta effettuate le incisioni, il chirurgo procede con il riposizionamento dei tessuti profondi, come il SMAS (Sistema Muscolo Aponeurotico Superficiale), che viene sollevato e tirato per ripristinare il volume del viso e correggere la caduta dei tessuti. Questo è uno dei passaggi più importanti dell'intervento, poiché contribuisce a dare un aspetto naturale e giovanile al volto. La pelle in eccesso viene quindi rimossa per evitare che appaia "tirata". Chiusura delle incisioni
Dopo aver riposizionato e sollevato i tessuti, il chirurgo chiude le incisioni con punti di sutura sottili, che favoriscono una guarigione estetica ottimale. Grazie alla precisione delle tecniche moderne, le cicatrici risultano molto discrete, specialmente perché vengono nascoste lungo le linee naturali del viso e del cuoio capelluto. Lifting del collo (se combinato).
In molti casi, il lifting del viso viene abbinato a un lifting del collo. Le incisioni si estendono dietro le orecchie per permettere al chirurgo di intervenire anche sul collo, rimuovendo l'eccesso di pelle e riposizionando i muscoli per ottenere un risultato più armonioso e giovanile.
- **Follow-up:** osservare un periodo di riposo di 5-8 giorni, durante il quale è meglio evitare attività fisiche eccessive, alcool, fumo, bagni turchi e saune. Durante questi giorni è meglio anche rinunciare alle creme per il viso

4. RESPONSABILITÀ

- **Medico Chirurgo:** Esegue l'intervento e garantisce la sicurezza del paziente.
- **Direttore Sanitario:** Verifica l'applicazione del protocollo.
- **Personale Infermieristico:** Assiste il paziente nel pre e post-operatorio.

5. ALLEGATI

- Modulo di consenso informato.
- Linee guida AICPE per il lifting del volto e del collo.
- Registro sala operatoria
- Fascicolo sanitario

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Linee Guida Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (AICPE)
- Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE) ha pubblicato linee guida specifiche per la profilassi antibiotica e altre procedure correlate
- Linee guida AICPE per il lifting del volto e del collo
- D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro.

7. MONITORAGGIO

Fattore	Obiettivo	Indicatore	Target	Documento di provenienza	Frequenza misurazione
Qualità del servizio Erogato	Corretta compilazione del fascicolo sanitario	% di complicanze post-operatorie	>2%	Fascicolo Sanitario	A fine intervento
Qualità del servizio Erogato	Soddisfazione Paziente	% di soddisfazione del paziente	90% paziente soddisfatto	Questionario Soddisfazione Paziente	A fine intervento